

À qui est recommandée la vaccination?

La vaccination n'est pas recommandée à l'ensemble de la population. Pour l'instant, la vaccination est recommandée uniquement aux personnes potentiellement exposées à la variole. Il s'agit:

- des hommes ayant des rapports sexuels avec des partenaires masculins en dehors d'une relation stable exclusive
- des personnes trans ayant des rapports sexuels avec des partenaires masculins en dehors d'une relation stable exclusive
- du personnel médical exposé au virus

- de toute personne ayant été en contact rapproché avec une personne ayant reçu un diagnostic de variole

Où puis-je me vacciner contre la variole ?

Toutes les informations concernant l'offre de vaccination sur:



drgay.ch/mpx

Combien d'injections de vaccin dois-je faire ?

Historique vaccinal

Je n'ai jamais reçu de vaccin contre la variole.



J'ai déjà reçu un vaccin contre la variole lorsque j'étais enfant.

Jusqu'en 1972 à peu près, les enfants étaient vaccinés en Suisse.



J'ai déjà reçu une injection de vaccin à l'étranger.

Avec MVA-BN (Imvanex, Jynneos ou Imvamune)



J'ai déjà reçu deux injections de vaccin à l'étranger.

Avec MVA-BN (Imvanex, Jynneos ou Imvamune)



Schéma vaccinal

Deux doses à au moins 4 semaines d'intervalle.

Une dose.

Une dose supplémentaire.

Aucune dose supplémentaire.

Pour les personnes immunosupprimées et immunodéficientes, nous recommandons dans tous les cas deux doses.

Se

vacciner

avant de

s'infecter

Protégeons-nous ensemble de la variole du singe avec la vaccination.
En savoir plus sur drgay.ch/mpx

TOUT SUR LA VACCINATION

Comment se passe la vaccination ?

Il s'agit du MVA-BN, un vaccin de troisième génération contre le virus de la variole humaine produit en Europe par Bavarian Nordic. Contrairement à l'ancien vaccin contre la variole humaine, il est mieux toléré et ne laisse aucune cicatrice. Le vaccin contient une version atténuée du virus de la variole qui ne peut pas rendre malade et qui n'est pas transmissible. Le MVA-BN protège également contre la variole du singe: après deux doses, presque tout le monde développe des anticorps. Il faut attendre quelques semaines pour que les effets du vaccin soient complets. C'est pourquoi cela vaut la peine de continuer à faire preuve de prudence.

Quelles informations sur moi devrais-je donner?

Lors de la consultation de vaccination, il est important de répondre aux questions sur les allergies, les maladies et les médicaments pris. De cette façon, il sera possible de clarifier la situation. Dans la majorité des cas, la vaccination sera possible. Le personnel du centre demandera peut-être de confirmer l'appartenance à un groupe exposé, car le vaccin n'est pas recommandé à tout le monde et il n'est disponible qu'en quantité limitée. Mais cela n'implique pas de communiquer des informations détaillées sur sa vie sexuelle ou sur son identité de genre.

Combien me coutera la vaccination ?

Il n'y aura rien à payer, la confédération prend en charge les coûts.

Comment le vaccin me sera-t-il administré?

Le vaccin est injecté soit dans le haut du bras (par voie sous-cutanée) soit dans la peau de l'avant-bras (par voie intradermique). Cela peut être désagréable. La plupart des personnes ont besoin de deux doses de vaccin à au moins quatre semaines d'intervalle.

La protection vaccinale sera-t-elle à 100% ?

Le vaccin réduit le risque d'infection. Tout aussi important: le vaccin réduit le risque d'évolution sévère des symptômes. Après une seule dose, la protection de l'organisme contre la variole n'est pas encore très forte. C'est pourquoi il est important de recevoir la vaccination complète.

Quels sont les effets secondaires?

Le vaccin est considéré comme sûr. Plusieurs milliers de personnes ont déjà reçu ce vaccin dans le monde entier. Comme c'est le cas pour tout vaccin, des réactions physiques peuvent survenir. Elles disparaissent en général après quelques jours. Les effets secondaires fréquents sont des maux de tête, de la fatigue, des nausées, des douleurs musculaires et des réactions au point d'injection. Des symptômes pseudo-grippaux apparaissent aussi parfois.

Que dois-je savoir de plus?

- Les personnes vivant avec le VIH peuvent se vacciner.
- Il est recommandé de se vacciner à partir de 18 ans, mais dans certains cas, il peut être judicieux de se faire vacciner même quand on est plus jeune.
- En cas de symptômes et notamment de fièvre à plus de 38,5 °C, il est recommandé de reporter la vaccination après le rétablissement.